

Avertissements agricoles



BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES POITOU-CHARENTES

GRANDES CULTURES

Bulletin n° 175 (03/90) du 21 Février 1990

COLZA	: Intervention charançons de la tige en fin de semaine
CEREALES	: Aggravation du risque Rouille Brune
	: Grille de risque Piétin

COLZA

Stade C2 (entre noeuds visibles) à D1 (boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales).

CHARANCON DE LA TIGE

Situation

Tout début de vol en toutes zones. Compte tenu des conditions de température et d'ensoleillement favorables, les parcelles seront envahies par ce ravageur d'ici la fin de semaine.

Préconisation

Intervenir en fin de semaine, début de semaine prochaine avec un pyrèthrine homologué.

MELIGETHES

Situation

Quelques captures de cet insecte en cuvette jaune. L'activité au champ est encore très limitée.

Préconisation

L'intervention charançon de la tige permettra d'éliminer les premiers méligèthes arrivés sur les parcelles.

POIS

Les semis les plus précoces sont levés.

SITONE

Situation

Activité encore très limitée.

Préconisation

Une intervention est justifiée si l'on observe des morsures sur l'ensemble des 1ères folioles ou 1ers stipules sur les types Afila.

Actuellement, il est trop tôt pour intervenir.

P. I. A.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL
DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
13, Rte de la Forêt - BIARD
86000 POITIERS Tél. : 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes
Directeur Gérant : J. P. PIQUEMAL
CPPAP n° 1664 A.D.
Abonnement annuel :
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

BLE

Stade : les semis les plus précoces atteignent le stade épi 1 cm.

Prévision - Situation**ROUILLE BRUNE**

Aggravation du risque ; 1990 pourrait ressembler à 1988.

OIDIUM

Les pluies enregistrées ont été insuffisantes pour faire regresser la maladie de façon sensible.

Cette maladie devra être prise en compte au stade 1 noeud selon la stratégie développée précédemment.

ROUILLE JAUNE

Devrait se développer courant montaison.

PIETIN VERSE

Légère augmentation du risque qui reste globalement modéré. L'évolution de ce champignon devrait être généralement tardive. La grille ci-après permettra de préciser le niveau du risque à la parcelle.

Date de levée		Type de sol	Précédents
avant le 31 octobre	5	Sols limoneux + 5	Blé en 89 + 2
Du 1 au 20 Novembre	3	Groies séchantes + 1	Blé en 88 + 3
Du 20 Novembre au 10 Décembre	1	Sols de marais 0	Blé en 87 + 4
Après le 10 Décembre	0	Autres types de sol + 3	Blé en 89 et 88 + 5 Blé en 89 et 87 + 5 Blé en 88 et 89 + 6
Note 1 <input type="checkbox"/>		Note 2 <input type="checkbox"/>	Note 3 <input type="checkbox"/>

Note globale = Note 1 + Note 2 + Note 3

Note globale inférieure à 6 = risque piétin très faible

Note globale entre 6 et 10 = risque piétin très limité

Note globale entre 11 et 15 = risque piétin moyen

Note globale supérieure à 15 = risque piétin élevé

Préconisation

Une intervention **polyvalente** contre les maladies du pied et des feuilles (rouilles, oïdium et septoriose) est à prévoir dès le stade 1 noeud dans les blés levés en octobre et novembre.

Cette intervention pourra être reportée au stade 2 noeuds - sortie dernière feuille dans les levées de décembre.

ORGE**MALADIES****Situation**

Oïdium, rouille naine et helminthosporiose sont bien implantées dans les parcelles.

Préconisation

Prévoir une intervention sur ces 3 maladies au stade 1 noeud avec un fongicide renforcé sur oïdium si la maladie est très présente dans la parcelle (semis précoces).